

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 12-4-65 339989

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION de la STATION de BORDEAUX (Tél. 92-26-94)

ABONNEMENT ANNUEL...
15 NF

(GIRONDE, DORDOGNE, LOT-&-GARONNE, LANDES,
BASSES-PYRÉNÉES, CHARENTE, CHARENTE-MARITIME)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, Chemin d'Artigues, CENON (Gironde)
C. C. P. : BORDEAUX 6707-65

Supplément N° I au Bulletin Technique N° 55 d'Avril 1965

I965-9

AVERTISSEMENTS

- ARBRES FRUITIERS -

Tavelures des Poiriers et des Pommiers : L'évolution rapide des boutons floraux nécessite une nouvelle protection car les prochaines projections d'Ascospores risquent d'être importantes.

Acariens : On peut rencontrer actuellement deux espèces d'Araignées rouges.

1°) Bryobia rubrioculus : Les éclosions sont pratiquement terminées. Pour éviter les dégâts sur les jeunes pousses, qui sont rares dans les vergers industriels, un traitement est conseillé dès à présent.

2°) Panonychus ulmi : Les oeufs d'hiver fréquents dans la plupart des vergers, sont en cours d'éclosion. Dans les zones les mieux exposées des Basses-Pyrénées, des Landes et du Lot et Garonne le traitement devrait être prévu à partir du 15 avril. Pour les autres régions, des précisions seront fournies dans notre prochain Bulletin.

Hoplocampes des Poires : La ponte généralement abondante cette année, s'est effectuée du 25 mars au début d'avril.

Les premières éclosions venant d'avoir lieu, il devient nécessaire de prévoir un traitement immédiat avec une spécialité à base de H.C.H., de Lindane ou de Parathion, en particulier dans les vergers attaqués les années précédentes. Commencer par les variétés défleuries (Protection des Abeilles) et bien mouiller les organes floraux.

- VIGNE -

Black-Rot : Les températures élevées de la fin du mois de mars ont provoqué un départ précoce et rapide de la végétation dans les vignobles les mieux exposés. De même, les Périthèces de Black-Rot viennent d'arriver à maturité.

Les premières pluies importantes entraîneront des projections d'Ascospores et permettront les premières contaminations primaires.

En conséquence, il serait utile d'effectuer un premier traitement mais seulement sur les vignes contaminées l'an dernier ou se trouvant près de parcelles incultes et dont le débourrement est bien avancé.

INFORMATIONS

Coupe-bourgeons et Chenilles bourruées : Contre ces insectes qui dévorent les bourgeons en voie de débourrement, on peut appliquer un insecticide: D.D.T., H.C.H. ou Parathion contre le Coupe-bourgeons, Arséniate de plomb par exemple contre les Chenilles.
Bordeaux, le 8 avril 1965

Le Contrôleur chargé des Avertissements
C. ROUSSEL

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux
J. BRUNETEAU

Imprimerie de la Station de Bordeaux - Directeur-Gérant: L. BOUYX

P162